

SKÖTSEL AV HÄCKAR

Placering

Det finns alltid en häck för varje plats. Tänk på om du ska ha en formklippt häck som inte blir så bred eller en friväxande häck som blir bredare, vintergrön eller lövfällande.

Plantering

Gräv en ordentlig grop, lägg till 30 % av vår planteringsjord i gropen och blanda med den befintliga jorden med lite gödning. Plantera, vattna och trampa sedan till jorden ordentligt.

Gödning

Gödning sker i april och juli och då använder du Blåkorn eller Kogödsel.

Beskärning av formklippta häckar som Avenbok, Bok, Oxel m.fl.

Plantering och år 1

Klipp bort skadade grenar och korta in sidogrenar till hälften, låt toppskottet vara intakt. Finns inget toppskott tas det översta sidoskottet och binds rakt upp med en bambukäpp. Forma häcken så den blir smal upptill och bredare nedtill. I mitten av juli då häcken vuxit en bit skall alla skott som vuxit ut sedan planteringen utom toppskottet kortas in till hälften. Efter avslutad växtperiod i oktober – november klippas lövfällande växter ännu en gång, hälften av det som vuxit ut sedan förra beskärningen tas bort.

År 2-3

Beskärningen består i att korta in alla sidogrenar till hälften av årets tillväxt och låta toppskottet vara intakt vid de båda klippningstillfällena i juli och oktober – november. Forma häcken så den blir bredare nertill och smalare upptill.

År 4 och framöver

När häcken nått den höjd du vill klipper du toppskottet och beskär som tidigare år.

Beskärning av formklippta häckar som Häckoxbär, Liguster, Måbär, Buxbom m.fl.

Plantering och år 1

Klipp ned alla grenar till halva höjden (Liguster till 30 cm höjd). Beskär sedan i juli och oktober/november 50 % av den senaste tillväxten och ta även bort toppskotten.

År 2-4

Beskärning: I juli och oktober – november klippas 50 % av senaste tillväxten bort även toppskotten.

Beskärning av friväxande häckar som Häggmispel, Vresros, Spirea, Syrén m.fl.

Du skall forma din häck så att den får en konad form i genomskärning. Häcken skall vara bred nedtill och smal upptill. Det gör att mer av bladverket nertill får bättre ljus och kan därför stärkas i förhållande till toppen. Beskärningen sker i olika perioder beroende på sort.